



Date tehnice

Substanță activă:	480 g/L bentazonă
Formulare:	Concentrat solubil
Număr certificat omologare:	433PC/05.06.2018
Ambalaj:	1 L, 5 L



Caracteristici și mod de acțiune

Basagran® SL este un erbicid pe bază de bentazonă, din grupa diazinelor. Basagran® SL are o acțiune de contact cu impact asupra procesului de fotosinteză, fiind absorbit prin frunze și alte

organe verzi. Efectul este vizibil după aproximativ 2 zile, manifestat prin îngălbenirea buruienilor sensibile și apoi necrozarea lor.



Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare	Doză
Cereale, porumb, cartof, amestec cereale - leguminoase	Buruieni dicotiledonate	2,0 L/ha Se aplică în postemergența culturilor; buruieni în faza de 2-4 frunze (BBCH 12-14).
Trifoi, lucernă, amestec trifoi - graminee	Buruieni dicotiledonate	2,0 L/ha Se aplică în postemergența culturilor; buruieni în faza de 2-4 frunze (BBCH 12-14).
Bob, soia, fasole, mazăre	Buruieni dicotiledonate	2,0 L/ha Se aplică în postemergența culturilor; buruieni în faza de 2-4 frunze (BBCH 12-14).



Recomandări

Basagran® SL este un erbicid cu aplicare în postemergența culturii. Buruienile trebuie să fie răsărite și să se afle în faza de 2-4 frunze, respectiv BBCH 12-14, iar plantele de cultură în stadiul de 2-4 frunze adevărate. Este recomandat ca tratamentul să se realizeze când temperatura aerului este mai mare de 15°C și umiditatea aerului mai mare de 40%. Se va evita efectuarea tratamentului în perioadele de stres ale plantelor de cultură.

Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a erbicidelor utilizate în mod obișnuit la culturile sus menționate. Se vor utiliza duze specifice aplicării erbicidelor. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit. Se recomandă utilizarea a 200-400 L/ha soluție de erbicidat.



Avantaje

- Erbicid standard pentru combaterea buruienilor în culturile de leguminoase.
- Folosire la numeroase culturi.
- Formulare îmbunătățită.



Cultura

