



Date tehnice

Substanță activă: 100 g/L Revysol® (mefentrifluconazol) + 200 g/L boscalid
Formulare: Suspensie concentrată
Număr certificat omologare: 835PC/25.04.2023
Ambalaj: 5 L



Caracteristici și mod de acțiune

Produsul Pictor® Revy conține două substanțe active, respectiv noul triazol Revysol® (mefentrifluconazol), ce aparține grupului de inhibitori ai biosintezei sterolului, și boscalid, din grupa piridin-carboxamide (inhibitori ai succinat dehidrogenazei). Substanța activă Revysol® este preluată rapid de către frunze și apoi translocată apical. Revysol® are o acțiune sistemică oferind protecție de lungă durată datorită rezervoarelor de substanță

activă ce se formează în epiderma frunzelor după translocare. De asemenea, Revysol® asigură și un efect curativ de excepție. Substanța activă boscalid acționează asupra complexului II al ciclului Krebs al metabolismului agentului patogen, ducând la stoparea producerii de energie în celulele patogenului.



Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare		Doză
	Denumirea științifică	Denumirea populară	
Rapiță de toamnă și rapiță de primăvară	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Putregaiul alb	0,6 – 1 L/ha
	<i>Alternaria spp.</i>	Alternarioza	
Floarea-soarelui	<i>Diaporthe helianthi</i>	Pătarea brună și frângerea tulpinii	0,6 – 1 L/ha
	<i>Plenodomus lindquistii</i>	Pătarea neagră	
	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Putregaiul alb	
	<i>Alternaria helianthi</i>	Alternarioza	



Recomandări

Rapiță de toamnă și rapiță de primăvară: se poate aplica maximum 1 tratament pe sezon, pe perioada de vegetație BBCH 57-75, respectiv de la momentul în care bobocii florali de pe inflorescențele secundare sunt vizibili, dar încă închiși, și până când 50% din silicve au ajuns la mărimea finală.

Floarea-soarelui: se pot aplica maximum 2 tratamente pe sezon, la un interval minim de 7 zile

între tratamente, pe perioada de vegetație BBCH 31-69. În cazul în care se aplică două tratamente pe sezon, primul tratament se efectuează pe perioada de vegetație BBCH 31-59, respectiv de la primul internod vizibil de la momentul alungirii tulpinii și până la momentul în care florile ligulate sunt vizibile, dar inflorescența încă închisă, iar al doilea tratament pe perioada de vegetație BBCH 61-69, respectiv pe perioada înfloritului.



Tehnica de aplicare

Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a fungicidelor, utilizate în mod obișnuit la culturile mai sus menționate. Se vor utiliza duze specifice aplicării fungicidelor. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit și se situează între 100-400 L/ha.



Avantaje

- Compoziție revoluționară și formulare special dezvoltată pentru rapiță și floarea-soarelui.
- Combaterea unui spectru larg de boli la un nivel ridicat de eficacitate.
- Fereastră de aplicare extinsă și un volum de apă optimizat.



Cultura

