



## Stadiul omologărilor în România

| Cultură                                      | Organism ținta                                         | Doză                                                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Floarea-soarelui                             | <i>Aphis fabae</i> ,<br><i>Brachycaudus helichrysi</i> | 120 g/ha<br>160 g/ha - infestări puternice                                             |
| Măr                                          | <i>Afide</i><br>( <i>Dysaphis plantaginea</i> )        | 0,01% (0,15 kg/ha)                                                                     |
| Piersic                                      | <i>Myzus persicae</i>                                  | 0,012 - 0,014 %<br>(0,120 - 0,140 kg/ha/1000 l apă în funcție de nivelul de infestare) |
| Prun                                         | <i>Hyalopterus pruni</i>                               | 0,012 - 0,014 %<br>(0,120 - 0,140 kg/ha/1000 l apă în funcție de nivelul de infestare) |
| Ardei câmp                                   | <i>Myzus persicae</i>                                  | 0,012 - 0,014 %<br>(0,120 - 0,140 kg/ha în funcție de gradul de infestare)             |
| Plante ornamentale<br>din parcuri și grădini | <i>Macrosiphon rosae</i>                               | 0,012 - 0,014 %<br>(în funcție de gradul de atac) administrare foliară                 |
| Cartof                                       | <i>Afide</i>                                           | 0,140 - 0,160 kg/ha<br>(în funcție de gradul de infestare)                             |

## Pregătirea soluției de stropit

Se introduce în rezervor jumătate din cantitatea de apă, se adaugă Teppeki (pompa de circulație trebuie să fie tot timpul conectată în timpul umplerii), iar apoi se continuă umplerea rezervorului cu cantitatea de apă rămasă. Agitatorul trebuie să funcționeze pe tot parcursul tratamentului.

Nu preparați mai multă soluție decât este nevoie. Volumul de soluție variază în funcție de cultură de la 200 la 1000 l/ha, însă este foarte important să se respecte doza recomandată. Volumul de soluție la plantațiile pomicole este 800 - 1000 l/ha, la ardei 500 l/ha, la plante ornamentale 1000l/ha, la cartof și floarea soarelui 300 - 400 l/ha



Teppeki\_RO\_4P\_feb11



## Insecticid sistemic pentru combaterea afidelor din culturile de floarea soarelui, măr, piersic, prun, ardei câmp, plante ornamentale și cartof



**Insecticid**


- Un nou mod de acțiune
- Excelentă eficiență
- Nu are efecte negative asupra prădătorilor naturali ai afidelor
- Profil toxicologic și de mediu excelent

O nouă și eficace substanță activă:  
**Flonicamidul**  
descoperit, înregistrat și dezvoltat de Ishihara Sangyo Kaisha  
(ISK) - Japonia



# teppeki®

Formulare:  
WG (granule dispersabile)



## Un nou mod de acțiune

Fonicamidul aparține unei noi clase chimice : pyridinecarboxamide

Fonicamidul este unicul reprezentant al acestei clase

Nu are rezistența încrucișată cu alte insecticide

## Excelentă eficiență

Acționează atât asupra stadiilor imature de afide cât și asupra celor adulte

Temperaturile ridicate nu reduc eficacitatea produsului

În mai puțin de trei ore de la aplicare, produsul nu mai poate fi spălat de ploaie

Un mijloc eficient și semnificativ în controlul rezistenței dăunătorilor

## Nu are efecte negative asupra prădătorilor naturali ai afidelor

## Profil toxicologic și de mediu excelent

## Mod de întrebuințare

Teppeki se aplică la avertizare, prin stropiri, pentru prevenirea și combaterea afidelor din plantațiile pomicele, din culturile de floarea soarelui, ardei, plante ornamentale și cartof. Se efectuează 2 tratamente pe sezon la prun, piersic, cartof și plante ornamentale, 2 - 3 tratamente la măr și un singur tratament la ardei (în doza de 0,120 kg/ha) și floarea soarelui. Foarte important, la floarea soarelui tratamentul se aplică cu 8-10 zile înainte de înflorire. Intervalul de timp între tratamente este de 14 - 21 zile la măr, prun, piersic și 21 de zile la cartofi și plante ornamentale. Timpul de pauză este de 21 de zile la măr, prun, piersic, 14 zile la cartof și 1 zi la ardei (la doza de 0,100 kg/ha).



## MOD SPECIFIC DE ACȚIUNE – PERFORMANȚĂ RIDICATĂ

### Acțiunea fonicamidului asupra afidelor

Teppeki acționează prin contact și ingestie.

Produsul nu este un neonicotinoid, ci

acționează asupra stomacului insectelor

inhibând necesitatea hrănirii acestora. Acestea

încetează să se mai hrănească la mai puțin de

o oră de la aplicarea produsului, iar moartea


survine din cauza deshidratării și înfometării.

Moartea afidelor are loc treptat începând

din prima zi după aplicarea tratamentului și

continuă până în cea de-a patra zi.

### Impactul asupra afidelor după hrănire



## Nu are efecte negative asupra prădătorilor naturali ai afidelor



### Activitatea fonicamidului în plantă

Fonicamidul are activitate translaminară și

sistemică în plantă, fapt ce conferă produsului

o combatere de durată.

