ARTWORK INFO			TEMPLATE INFO				
PRODUCT DESCRIPTION: MEGAFOL 10L 556 DRAFT N. 02 08/04/2025 APPROVAL DATE: DD/MM/YYYY CODE: PPE4229484-L1135254 COUNTRY: SL-HR-EL-BG-HU-RO	NO. OF COLOURS: 3 COLOUR 1: K COLOUR 2: P.144C COLOUR 3: P.1235C	COLOUR 4: COLOUR 5: COLOUR 6:	PE DESCRIPTION: LABEL / PLASTIC SIZE: 160 X 190 MM TECH. INFO: PRINTING TYPE: DIGITAL	SCALE: 1:1	ISSUE NO: **DRAFT #6**	ISSUE DATE: xx.02.2025	**4188519 MILL**

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plait avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

Strengthen your crop

syngenta® Biologicals

BIOSTIMULANT

Megafol™

CE

SLOVENŠČINA | **NEMIKROBNI RASTLINSKI BIOSTIMULANT**

NAVEDBE: TOLERANCA NA ABIOTSKI STRES (STRES ZARADI MRAZA IN VROČINSKI STRES), IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNIH LASTNOSTI: MEGAFOL SPODBUJA VEGETATIVNI RAZVOJ RASTLIN

Sestavine: Vinasa, EC št. 932-215-9 (KSM 6: Stranski proizvodi živilske industrije); Kalijev acetat, CAS št. 127-08-2 (KSM 1: Snovi in zmesi neobdelanega materiala); Sečnina, CAS št. 57-13-6 (KSM 1); Izvleček *Ascophyllum nodosum*, CAS št. 84775-78-0 (KSM 1); Koruzni macerat, CAS št. 66071-94-1 (KSM 1).

Formulacija: Tekočina. **Navodila za uporabo - toleranca na abiotski stres:** Foliarno nanašanje. Kulture: Vse kulture (poljščine, lesnate trajnice (sadno drevje, trta, oljke, hmelj in druge), okrasne rastline, aromatične in zdravilne rastline ter vrtnine); Odmerek: 2-3 l/ha; Čas uporabe: 24-48 ur pred stresom in 24-48 ur po stresu, skozi celotno vegetacijsko obdobje; Število uporab: 2.
Opombe: Brez omejitev za katero koli specifično skupino kultur. Najmanjši volumen razredčevanja: pri volumnih vode, manjših od 150 l/ha, sta potrebna preskus mešanja in lokalni preskus uporabe. Uporaba med cvetenjem: da. Število uporab se nanaša na en sam stresni dogodek. Ponoviti ob vsakem stresnem dogodku med rastnim ciklom rastline.
Navodila za uporabo - izboljšanje kakovostnih lastnosti: Foliarno nanašanje. Lesnate trajnice (sadno drevje, trta, oljke, hmelj in druge), vrtnine, okrasne rastline ter aromatične in zdravilne rastline: Odmerek: 2-3 l/ha; Čas uporabe: Cvetenje, po zasnovi plodov in med razvojem plodov. Število uporab: 3. Poljščine: Odmerek: 2-3 l/ha; Čas uporabe: med vegetativno rastjo; Število uporab: 1.
PREVIDNOST: Ne mešajte z bakrom na kulturah, občutljivih na ta element, z izjemo oljke, vinske trte, artičoke, paradižnika. Ne mešajte z mineralnimi olji.
PROFESIONALNA UPORABA: Za podrobnejša priporočila se obrnite na lokalnega predstavnika podjetja Syngenta. www.syngentabiologicals.com. Ti odmerki so priporočeni. Pridelovalcem priporočamo, da se posvetujejo s svojim svetovalcem zaradi prilagoditve priporočil njihovim posebnim razmeram in preprečitve prekomernega gnojenja.
Priporočeni pogoji shranjevanja: Pred uporabo temeljito premešajte. Če se hrani med 0 in 35°C, proizvod nima težav pri skladiščenju.
Informacije o varnosti in okolju: To gnojilo vsebuje sečnino, ki lahko sprošča amoniak in vpliva na kakovost zraka. Glede na lokalne razmere je treba sprejeti ustrezne sanacijske ukrepe. Da bi se izognili tveganjem za zdravje ljudi in okolje, upoštevajte navodila za priporočeno uporabo tega sredstva za gnojenje.
Ta proizvod je certificiran s strani CerTrust Ltd., certifikat št. FB 006436
Proizvajalec: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811
Distributer v Sloveniji: Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, Ljubljana, tel.: 01 436 12 03

HRVATSKI | **NEMIKROBNI BILJNI BIOSTIMULANS**

TVRDNJE: TOLERANCIJA NA ABIOTIČKI STRES (STRES OD HLADNOĆE I STRES OD VRUĆINE). POBOLJŠANJE KVALITATIVNIH SVOJSTAVA: MEGAFOL POTIČE VEGETATIVNI RAZVOJ BILJAKA

Sastojci: Vinasa, EC br. 932-215-9 (CME 6.: Nusproizvodi prehrambene industrije); Kalijev acetat, CAS br. 127-08-2 (CMC 1.: Tvari i smjese iz nepreradenih sirovina); Urea, CAS br. 57-13-6 (CMC 1); Ekstrakt *Ascophyllum nodosum* CAS br. 84775-78-0 (CMC 1); Kukuruzna močevina, CAS br. 66071-94-1 (CMC 1)

Formulacija: Tekućina. **Upute za upotrebu - Folijarna primjena za toleranciju biljaka na abiotički stres.** Usjevi: Svi usjevi (ratarski usjevi, drvenaste višegodišnje biljke i povrće); Količina primjene: 2-3 l/ha; Vrijeme primjene: 24-48 sati prije stresa i 24-48 sati nakon stresa, tijekom cijelog vegetacijskog razdoblja; Broj primjena: 2.
Napomene: Bez ograničenja na svim navedenim kulturama. Minimalni volumen razrjeđivanja: Ako se planira primijeniti s nižim utroščima škropiva (ispod 150 l/ha) preporučamo prethodno napraviti test razrjeđivanja. Dozvoljena primjena tijekom cvatnje. Broj primjena odnosi se na jedan stresni događaj. Ponoviti pri svakom stresnom događaju tijekom ciklusa usjeva.
Upute za upotrebu - Primjenjuje se folijarno (prskanjem) u cilju poboljšanja kvalitativnih svojstava. Drvenaste višegodišnje biljke, povrće, ukrasno bilje, aromatično i ljekovito bilje: Količina primjene: 2-3 l/ha; Vrijeme primjene: Cvatnja, zametanje plodova, intenzivan rast i razvoj plodova. Broj primjena: 3. Ratarski usjevi: Količina primjene: 2-3 l/ha; Vrijeme primjene: tijekom cijelog vegetativnog rasta; Broj primjena: 1.
Napomene: Nema ograničenja za bilo koju specifičnu skupinu usjeva. Minimalni volumen razrjeđivanja: Ako se planira primijeniti s nižim utroščima škropiva (ispod 150 l/ha) preporučamo prethodno napraviti test razrjeđivanja. Dozvoljena primjena tijekom cvatnje. Broj primjena odnosi se na jedan stresni događaj. Ponoviti pri svakom stresnom događaju tijekom ciklusa usjeva.
OPREZ: Ne miješati s bakrenim pripravcima na usjevima osjetljivan na bakar, s izrazimkom masline, vinove loze, artičoke, rajčice. Ne miješati s mineralnim uljima.
PROFESIONALNA UPORABA: Za konkretnije preporuke obratite se lokalnom prodajnom predstavniku tvrtke Syngenta. www.syngentabiologicals.com. Ove stope primjene proizvoda su preporuke. Navedene količine primjene proizvoda samo su preporuke. Poljoprivrednicima preporučujemo da se obrate svojem savjetniku kako bi se preporuke prilagodile njihovim potrebama i izbjeglo pretjerano gnojenje.
Preporučeni uvjeti skladištenja: Temeljito promiješati prije uporabe. Ako se skladišti izmedu 0-35°C, proizvod nema problema sa skladištenjem.
Informacije o sigurnosti i zaštiti okoliša: Ovo gnojivo sadržava ureu, koja može ispustiti amonijak i utjecati na kvalitetu zraka. Ovisno o lokalnim uvjetima moraju se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere. Kako bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati preporuka iz uputa za upotrebu ovog gnojidbenog proizvoda.
Ovaj proizvod je certificiran od strane CerTrust Ltd., certifikat br. FB 006436
Proizvođač: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811
Distributer u Hrvatskoj: Syngenta Agro d.o.o., Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, tel.: 01/3887-670, faks:01/3887-671.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | **ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΦΥΤΩΝ**

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ: ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ (ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΨΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΙΑΣ). ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ: ΤΟ MEGAFOL ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Συστατικά: Βινάσσα, EC Nº 932-215-9 (ΚΣΥ 6: Υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων); Οξικό κάλιο, CAS 127-08-2 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών); Ουρία, CAS 57-13-6 (ΚΣΥ 1); Εκχύλισμα *Ascophyllum nodosum* CAS 84775-78-0 (ΚΣΥ 1); Υγρό εκχύλισης αραβοσίτου, CAS 66071-94-1 (ΚΣΥ 1).

Σύνθεση: Υγρό. **Οδηγίες χρήσης - Ανοχή σε αβιοτική καταπόνηση:** Διαφυλλική εφαρμογή. Καλλιέργειες: Όλες οι καλλιέργειες (Εκτατικές καλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες και κηπευτική), Δόση εφαρμογής: 200-300 κ.εκ/στρ, Στάδιο εφαρμογής: 24-48 ώρες πριν την επικράτηση συνθήκων αβιοτικής καταπόνησης και 24-48 ώρες μετά την καταπόνηση, καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Αριθμός εφαρμογών: 2.
Σημειώσεις: Κανένας περιορισμός για καμία συγκεκριμένη ομάδα καλλιεργειών. Ελάχιστος όγκος ραιώσης: σε περίπτωση όγκου μικρότερου από 15 λίτρα/στρ απαιτείται δοκιμαστική ανάμειξη και τοπική εφαρμογή. Εφαρμογή κατά την ανθοφορία: ναι. Ο αριθμός των εφαρμογών αντιστοιχεί σε ένα μεμονωμένο συμβάν καταπόνησης. Να επαναλαμβάνεται σε κάθε εμφάνιση καταπόνησης κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης.
Οδηγίες χρήσης - Βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών: Διαφυλλική εφαρμογή. Δενδρώδεις καλλιέργειες, Κηπευτικά, Καλλωπιστικά και Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά: Δόσεις εφαρμογής: 200-300 κ.εκ/στρ, Χρόνος εφαρμογής: Άνθηση, μετά την καρπόδεση και διόγκωση των καρπών. Αριθμός εφαρμογών: 3. Εκτατικές καλλιέργειες: Δόσεις εφαρμογής: 200-300 κ.εκ/στρ, Χρόνος εφαρμογής: κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης. Αριθμός εφαρμογών: 1.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αναμιγνύετε με χαλκό σε καλλιέργειες ευαίσθητες σε αυτό το στοιχείο, με εξαίρεση την ελιά, το αμπέλι, την αγκινάρα, την ντομάτα. Μην αναμιγνύετε με έλαια.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Για πιο συγκεκριμένες συστάσεις, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Syngenta. www.syngentabiologicals.com. Οι δόσεις εφαρμογής του προϊόντος αποτελούν συστάσεις. Συνιστούμε στους αγρότες να αναζητούν συμβουλές από τον σύμβουλό τους για να προσαρμόσουν τις συστάσεις στη συγκεκριμένη κατάστασή τους και να αποφύγουν την υπερλίπανση.
Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης: Αναμείξτε καλά πριν από τη χρήση. Εάν αποθηκευτεί μεταξύ 0-35°C, το προϊόν δεν παρουσιάζει προβλήματα αποθήκευσης.
Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον: Το λίπασμα αυτό περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να εκλύσει αμμωνία και να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, παρακαλούμε να τηρείτε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης αυτού του προϊόντος λίπανσης.
Το προϊόν αυτό είναι πιστοποιημένο από την CerTrust Ltd., αρ. πιστοποιητικού FB 006436
Κατασκευαστής: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811
Διανομέας στην Ελλάδα: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49. Τηλ.: 210 6666612-13, www.syngenta.gr. - ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
Διανομέας στην Κύπρο: Spyros Stavrinides Chemicals Ltd, 28 Λεωφόρος Στασίνου. 1060 Λευκωσία, Κύπρος, Τ.: 00357 22 447464.

MODE OF APPLICATION

FOLIAR

10 L

Powered by GEAPOWER®

L1135254 PPE 4229484 F

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plait avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

MEGAFOL™

L1135254 PPE 4229484 B

БЪЛГАРСКИ | **НЕМИКРОБЕН РАСТИТЕЛЕН БИОСТИМУЛАНТ**

ОБЯВЯВАНИЯ: ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ АБИОТИЧЕН СТРЕС (СТУДОВ СТРЕС И ТОПЛИНЕН СТРЕС). ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: MEGAFOL СТИМУЛИРА ВЕГЕТАТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЯТА

Съставки: Винаса, ЕС № 932-215-9 (КСМ 6: Странични продукти от хранително-вкусовата промишленост); Калиев ацетат, CAS № 127-08-2 (КСМ 1: Вещества и смеси от първични материали); Урея, CAS № 57-13-6 (КСМ 1); Екстракт от *Ascophyllum nodosum* CAS № 84775-78-0 (КСМ 1); Царевичен ликьор, CAS № 66071-94-1 (КСМ 1).

Формулация: Течност. **Указания за употреба - Толерантност към абиотичен стрес:** Листно приложение. Култури: Всички култури (полски култури, дървесни многогодишни и зеленчуци); Норма на приложение: 200-300 мл/дка; Време на приложение: 24-48 часа преди стреса и 24-48 часа след стреса, през целия вегетационен период; Брой приложения: 2.
Забележки: Без ограничение за която и да е специфична група култури. Минимален обем на разреждане: за обеми по-малки от 15 л/дка се изискват тестове за смесимост и локални тестове. Приложение по време на цъфтеж: да. Броят на приложенията се отнася за едно стресово събитие. Да се повтаря при всяко стресово събитие по време на цикъла на културата.
Указания за употреба - Подобряване на качествените характеристики: Листно приложение. трайни насаждения, зеленчуци, декоративни растения, а: Норма на приложение: 200-300 мл/дка; Време на приложение: Цъфтеж, след завързване и нарастване на плодовете. Брой приложения: 3. Полски култури: Норми на приложение: 200-300 мл/дка; Време на приложение: по време на вегетативния растеж; Брой приложения: 1.
ВНИМАНИЕ: Да не се смесва с Cu-съдържащи продукти при култури, чувствителни към този елемент, с изключение на маслиново дърво, лоза, артишок, домат. Да не се смесва с минерални масла.
ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА: Свържете се с местния представител на Syngenta за по-конкретни препоръки. www.syngentabiologicals.com. Настоящите норми на прилагане на продукта са препоръчителни.
Препоръчваме на земеделските стопани да потърсят съвет от консултант на Синджента, за да адаптират препоръчителните норми към своите конкретни условия и да избягват прекомерното наторяване.
Препоръчителни условия за съхранение: Разбъркайте/разклатете добре преди употреба. При съхранение между 0-35°C, продуктът няма проблеми със съхранението, остава стабилен.
Информация относно безопасността и опазването на околната среда: Този тор съдържа урея, която може да отдели амоняк и да окаже въздействие върху качеството на въздуха. Трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на това въздействие в зависимост от местните условия. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, моля, спазвайте инструкции за правилна употреба на този продукт за наторяване.
Този продукт е сертифициран от CerTrust Ltd., сертификат № FB 006436
Производител: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811
Дистрибутор в България: Булагро Груп Холдинг ЕАД, кв. Железник, Булагро център, 6014 гр. Стара Загора

MAGYAR | **NEM MIKROBIÁLIS NÖVÉNYI BIOSTIMULÁNS**

DEKLARÁLT HATÁS: ABIOTIKUSSTRESSZ-TOLERANCIA (HIDEG STRESSZ ÉS HŐ STRESSZ). MINŐSÉGI JELLEMZŐK JAVÍTÁSA: A MEGAFOL ELŐSEGÍTI A NÖVÉNYEK VEGETATÍV FEJLŐDÉSÉT

Összetevők: Vinasz, EC-szám: 932-215-9 (6. összetevő-kategória: Élelmiszeripari melléktermékek); Kálium-acetát, CAS-szám: 127-08-2 (1. összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek); Karbamid, CAS-szám: 57-13-6 (1. összetevő-kategória); *Ascophyllum nodosum* kivonat CAS-szám: 84775-78-0 (1. összetevő-kategória); Kukorica áztatóvíz, CAS-szám: 66071-94-1 (1. összetevő-kategória).
Formulációs: Folyékony. **Használati utasítás - Abiotikusstress-tolerancia:** Levélkezelés. Növények: Minden növény (Szántóföldi növények, fás évelők és zöldségek); Alkalmazási arány: 2-3 l/ha; Alkalmazás időpontja: 24-48 órával a stressz előtt és 24-48 órával a stressz után, a teljes vegetációs időszak alatt; Alkalmazások száma: 2.
Megjegyzések: Nincs korlátozás egyetlen specifikus növénycsoportra sem. Minimális hígítási térfogat: 150 l/ha-nál kisebb térfogatok esetén keverhetőségi tesztek és helyi tesztek szükségesek. Alkalmazás virágzás alatt: igen. Az alkalmazások száma egy stressz eseményre vonatkozik. Ismételje meg minden stressz eseménynél a növény ciklusa során.
Használati utasítás - Minőségi jellemzők javítása: Levélkezelés. Fás évelők, Zöldségek, Dísznövények és AMP: Alkalmazási arányok: 2-3 l/ha; Alkalmazás időpontja: Virágzás, kötődés és gyümölcsnövekedés után. Alkalmazások száma: 3. Szántóföldi növények: Alkalmazási arányok: 2-3 l/ha; Alkalmazás időpontja: vegetatív növekedés során; Alkalmazások száma: 1.
FIGYELEM: Ne keverje rézzel olyan növényeknél, amelyek érzékenyek erre az elemre, az olajfa, a szőlő, az artisóka és a paradicsom kivételével. Ne keverje ásványi olajokkal.
PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓK: Konkrétabb ajánlásokért lépjen kapcsolatba a helyi Syngenta képviselővel. www.syngentabiologicals.com. Az itt feltüntetett dózisok a termék alkalmazására ajánlások.A mezőgazdasági termelők számára azt tanácsoljuk, hogy konzultáljanak szaktanácsadójukkal, hogy az adott körülményekhez igazítsák a dózisokat, és elkerüljék a túlzott trágyázást.
Ajánlott tárolási körülmények: Használat előtt alaposan keverje össze. 0-35°C között tárolva a terméknek nincs tárolási problémája.
Biztonsággal és környezettel kapcsolatos információk: Ez a trágya karbamidot tartalmaz, amelyből ammónia szabadíthat fel és hatással lehet a levegő minőségére. A helyivizsonyoktól függően megfelelő helyreállítási intézkedésere van szükség. Az emberi egészséget és a környezetet érintő kockázatok elkerülése érdekében kérjük, tartsa be ennek a termékenyítő terméknek a használati utasítását.
Ezt a terméket a CerTrust Ltd. tanúsította, tanúsítvány száma: FB 006436
Gyártó: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

ROMÂNĂ | **BIOSTIMULATOR NEMICROBIAN AL PLANTELOR**

MENTIUNI: TOLERANȚĂ LA STRESUL ABIOTIC (STRES LA FRIG ȘI STRES LA CĂLDURĂ). ÎMBUNĂTĂȚIREA CARACTERISTICILOR CALITATIVE: MEGAFOL FAVORIZEAZĂ DEZVOLTAREA VEGETATIVĂ A PLANTELOR

Ingrediente: Vinasă, EC nr. 932-215-9 (CMC 6: Subproduse ale industriei alimentare); Acetat de potasiu, CAS nr. 127-08-2 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale pure); Uree, CAS nr. 57-13-6 (CMC 1); Extract de *Ascophyllum nodosum* CAS nr. 84775-78-0 (CMC 1); Apă de la înmuierea porumbului, CAS nr. 66071-94-1 (CMC 1)
Formulare: Lichidă. **Instrucțiuni de utilizare - Toleranță la stresul abiotic:** Aplicare foliară. Culturi: Toate culturile (Culturi de câmp, perene lemnoase și legume); Rata de aplicare: 2-3 l/ha; Momentul aplicării: 24-48 ore înainte de stres și 24-48 ore după stres, pe tot parcursul perioadei vegetative; Număr de aplicări: 2.
Note: Fără limitare pentru niciun grup specific de culturi. Volum minim de diluție: pentru volume mai mici de 150 l/ha sunt necesare teste de miscibilitate și teste locale. Aplicare în timpul înfloririi: da. Numărul de aplicări se referă la un singur eveniment de stres. Se repetă la fiecare eveniment de stres pe parcursul ciclului culturii.
Instrucțiunide utilizare - Îmbunătățirea caracteristicilor calitative: Aplicare foliară. Perene lemnoase, Legume, Plante ornamentale și PAM: Rate de aplicare: 2-3 l/ha; Momentul aplicării: Înflorire, după legare și creșterea fructelor. Număr de aplicări: 3. Culturi de câmp: Rate de aplicare: 2-3 l/ha; Momentul aplicării: în timpul creșterii vegetative; Număr de aplicări: 1.
ATENȚIE: Nu amestecați cu cupru pe culturile sensibile la acest element, cu excepția măslinului, viței-de-vie, anghinarei, tomatei. Nu amestecați cu uleiuri minerale.
UTILIZARE PROFESIONALĂ: Contactați reprezentantul local Syngenta pentru recomandări mai specifice. www.syngentabiologicals.com. Aceste doze de aplicare ale produsului sunt oferite cu titlu de recomandare. Fermierilor li se recomandă să solicite informații de la consilierul lor pentru a ajusta dozele la situația lor particulară și pentru a evita suprafertilizarea.
Condiții de depozitare recomandate: Amestecați bine înainte de utilizare. Dacă este depozitat între 0-35°C, produsul nu prezintă probleme de depozitare.
Informații privind siguranța și mediul: Acest îngrășământ conține uree, care poate elibera amoniac și poate avea un impact asupra calității aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate. Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare recomandate ale acestui produs fertilizant. Acest produs este certificat de CerTrust Ltd., certificat nr. FB 006436
Producător: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811
Distribuitor în România: Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Șos. București-Ploiești nr. 73-81, clădirea 3, etaj 4, tel. 021-528.12.00; tel urgență: 021-529.25.77; tel consiliere tehnică: 021-528.12.77.

MEGAFOL

EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo. EUH208 Sadrži 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju. EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. EUH208 Περιέχει 1,2-βενζοοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. EUH208 Sadržava 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Može da predizvika alergična reakcija. EUH210 Informacioneni list sa bezopasnost ue bude predstaven pri poiskvane. EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont. Allergiás reakciót válthat ki. EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható. EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Distributer v Sloveniji: Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, Ljubljana, tel.: 01 436 12 03
Distributer u Hrvatskoj: Syngenta Agro d.o.o., Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, tel.: 01/3887-670, faks:01/3887-671. **Διανομέας στην Ελλάδα:** Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49. Τηλ.: 210 6666612-13, www.syngenta.gr. - ΘΕΣ/ΚΗ: Βι.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
Διανομέας στην Κύπρο: Spyros Stavrinides Chemicals Ltd, 28 Λεωφόρος Στασίνου. 1060 Λευκωσία, Κύπρος, Τ.: 00357 22 447464. **Дистрибутор в България**: Булагро Груп Холдинг ЕАД, кв. Железник, Булагро център, 6014 гр. Стара Загора. **Distribuitor în România:** Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Șos. București-Ploiești nr. 73-81, clădirea 3, etaj 4, tel. 021-528.12.00; tel urgență: 021-529.25.77; tel consiliere tehnică: 021-528.12.77.
Proizvajalec / Proizvođač / Κατασκευαστής / Производител / Gyártó / Producător: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811
Prostornina (10 l) / neto teža (12,2 kg) / Volumen (10 l) / neto težina (12,2 kg) / Όγκος (10 l) / καθαρό βάρος (12,2 kg) / Обем (10 l) / нетно тегло (12,2 kg) / Térfogat (10 l) / nettó tömeg (12,2 kg) / Volum (10 l) / greutate netă (12,2 kg)

Datum proizvodnje - proizvodna serija: glejte tisk na embalaži / **Datum proizvodnje - proizvodna serija:** otisnuto na pakiranju. / **Ημερομηνία παραγωγής - παρτίδα παραγωγής:** δείτε την εκτύπωση στη συσκευασία / **Дата на производство - производствена партида:** вижте печата върху опаковката / **Gyártási dátum - gyártási tétel:** lásd a csomagoláson lévő nyomatot / **Data producției - lot de producție:** a se vedea imprimat pe ambalaj
Datum izteka roka uporabnosti: 3 leta od datuma proizvodnje / **Rok valjanosti:** 3 godine od datuma proizvodnje / **Ημερομηνία λήξης:** 3 έτη από την ημερομηνία παραγωγής / **Срок на годност:** 3 години от датата на производство / **Lejárati idő:** 3 év a gyártás dátumától / **Data expirării:** 3 ani de la data fabricației
Po uporabi embalažo pravilno odstranite. / Правилно zbrinuti ambalažu nakon uporabe. / Απορρίψτε σωστά τη συσκευασία μετά τη χρήση / Изхвърлете опаковката правилно след употреба / Használat után a csomagolást megfelelően ártalmatlanítsa
Eliminați corespunzător ambalajul după utilizare. După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit (pentru produse lichide). Ambalajele de plastic vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociației Industriei de Protecție a Plantelor din România - SCAPA. Ambalajele colectate prin acest program sunt inscripționate cu sigla SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 (apel gratuit), adresa email scapa@ecorecrecycling.ro sau consultați www.aiprom.ro, Agenția Județeană de Protecția Mediului sau distribuitorii locali pentru informații despre cel mai apropiat punct de colectare și calendarul de lucru al SCAPA. Nu refoliosiți ambalajele goale în alte scopuri!
FolIarno nanašanje / Folijarna primjena / Διαφυλλική εφαρμογή / Листно приложение / Levéltrágyázás / Aplicare foliară

SCAPA

8 031702 027325

Product names marked ® or ™ and the Syngenta Logo are Trademarks of the Syngenta group of companies